

**Cefalexina NORMON 500 mg cápsulas duras**  
**“500”**  
(CEFALEXINA)  
**CAPSULAS**

VIA ORAL

**COMPOSICION**

Cada cápsula contiene:

CEFALEXINA (DCI) (monohidrato) ..... 500 mg

Los demás componentes (excipientes) son: estearato de magnesio. Los componentes de la cápsula de gelatina son: gelatina, índigo carmín (E-132), amarillo de quinoleína (E-104), óxido de hierro amarillo (E-172) y dióxido de titanio.

**GENERALIDADES**

La CEFALEXINA, componente activo de la especialidad, es un antibiótico de amplio espectro y acción bactericida derivado de la Cefalosporina C, cuyo mecanismo de acción es el de interferir la biosíntesis de la pared bacteriana cuando se encuentran los gérmenes en fase de multiplicación. Es muy estable en medio ácido y se absorbe perfectamente en el tracto gastrointestinal, determinando niveles terapéuticos en plasma a los 60 minutos que perduran hasta 6 horas después de su ingestión. Se elimina por encima del 90% por riñón en forma activa y otra parte por la bilis donde pueden alcanzarse concentraciones terapéuticas.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.

Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, las tomas y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

**INDICACIONES**

Su uso está indicado en el tratamiento de todas las infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la Cefalexina.

La Cefalexina muestra actividad frente a gérmenes, tanto grampositivos como gramnegativos. Entre los cocos son sensibles la mayoría de los estafilococos, estreptococos, neumococos, *N. catarrhalis*, *N. meningitidis*. Los enterococos suelen ser resistentes.

Entre los bacilos son sensibles: el bacilo diftérico, muchas cepas de *Escherichia coli*, *Klebsiellas*, *Proteus mirabilis*.

**POSOLOGÍA**

**Adultos:** De 1 a 4 gramos al día, repartidos en 4 tomas.

**Niños y lactantes:** De 25 a 50 mg/Kg de peso al día repartidos en 4 tomas.

**CONTRAINDICACIONES**

Está contraindicado el uso de este preparado en pacientes con probada alergia a las Cefalosporinas y otros antibióticos de núcleo  $\beta$ -lactámico. Debe utilizarse con precaución en pacientes alérgicos a Penicilinas.

No se ha demostrado su inocuidad durante el embarazo.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Pueden producirse raramente leves intolerancias digestivas que suelen desaparecer sin necesidad de suspender la medicación.

En pacientes muy sensibles a la Cefalexina podrían aparecer: urticaria, eritemas multiformes, erupciones maculopapulosas y anafilaxia en personas muy sensibilizadas.

## **INCOMPATIBILIDADES**

Es incompatible la administración simultánea de este preparado con bacteriostáticos, anticoagulantes, potentes diuréticos (furosemida, ácido etacrínico) y agentes con nefrotoxicidad potencial.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

Los enfermos con insuficiencia renal intensa bajo tratamiento con esta especialidad, deben ser vigilados periódicamente ajustándose la posología si es necesario.

En los casos leves de sensibilización pueden administrarse antihistamínicos y corticosteroides.


En casos de anafilaxia deben administrarse rápidamente adrenalina, oxígeno y esteroides por vía intravenosa.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

## **PRESENTACIÓN**

CAPSULAS “500”: Envases con 28 cápsulas.

Conservar por debajo de 30°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de su farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **CON RECETA MÉDICA**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – (Madrid) ESPAÑA

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>.